

## ま え が き

この薬価基準は、平成30年3月5日厚生労働省告示第46号に基づき編集したものです。平成30年4月1日から実施されます。

本書の使用にあたっては、つぎの各項にご留意ください。

1. 内用薬、外用薬、歯科用薬剤は一括して品名50音順に配列し、そのあとに注射薬を品名50音順で記載しました。
2. 品名の前に付した略号は以下の通りです。

先……薬価制度において「先発医薬品」として整理しているもの

①……後発医薬品がない先発医薬品〔後発医薬品の上市前の先発医薬品等（平成30年4月1日現在）〕

②……後発医薬品がある先発医薬品〔先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む（平成30年4月1日現在）〕

① ②は厚生労働省ホームページ公開の「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）で更新されるので、最新の区分を確認してください。

☆……後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品

準……準先発品（昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち価格差のある後発医薬品があるもの）

後……診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

★……診療報酬上の加算等の対象から除外する後発医薬品〔先発医薬品と同額又は薬価が高いもの〕

以上は、「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平成30年4月1日適用）」（厚生労働省、平成30年3月5日公表）（<http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/04/tp20180401-01.html>）に準拠。

外……外用薬      歯……歯科用薬剤

劇……劇薬      向……向精神薬      毒……毒薬      覚……覚醒剤原料

麻……麻薬      生……生物由来製品      特……特定生物由来製品

処……処方箋医薬品（内用薬・外用薬・歯科用薬剤の該当品目に対して表示）

局……日本薬局方収載医薬品（統一名収載）

局……銘柄別収載日本薬局方収載医薬品

統……統一名で薬価収載された品目（統一名収載品目）

経……平成30年9月30日までが使用期限の経過措置品目。

経……平成31年3月31日までが使用期限の経過措置品目。

（経過措置品目は、平成30年3月5日厚生労働省告示第42号に基づく。）

※……製造販売承認の品名では、他社の品名と区別できない品目で、官報告示の際、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えたことを示す。

麻薬、毒薬、向精神薬、覚醒剤原料は、これらを調剤したとき加算（2種以上重複した場合は1種のみ）があるので、調剤料の算定の際には注意を要します。

また劇マークが付された品目であっても、散剤、細粒剤、顆粒剤であって、1服用単位ごとに分包化されたものは、劇薬から除外される場合もあります。

メーカー名は、製造販売承認取得会社名（可能な限りにおいて販売会社名）として記しました。薬価基準は、消費税に相当する額を含む価格で告示されています。

3. 内用薬、外用薬には可能な限り一般名（配合剤を除く）、用法・用量等（必要に応じて標榜薬効等）を付しました。

用法・用量は、あくまでも調剤報酬算定の参考のためであり（平成30年2月末時点での添付文書に準拠）、詳細等については、当該医薬品の添付文書を参照・確認・準拠してください。

4. 「薬効」と「分類」は原則として、「日本標準商品分類（平成2年6月改訂）」に準拠（一部改変）しております。本書p.xviiの薬効分類を参照してください。

2018年3月5日

（株）薬事日報社

薬価	区分	品名	(規格単位)	メーカー	薬効	用法	用量	分類
668.50	先①(外) 劇(処)	アイオピジンUD点眼液1%	(1%0.1mL1個)	ノバルティス	眼科用剤	アブラクロニジン塩酸塩点眼液[アブラクロニジンとして10mg(1mL中)]	レーザー照射1時間前、及び照射直後に術眼に1滴ずつ点眼(レーザー術後眼圧上昇防止剤)	1319
6,314.20	先①(劇) 処	アイクルシグ錠15mg	(15mg1錠)	大塚製薬	抗悪性腫瘍剤	ボナチニブ塩酸塩16.03mg(ボナチニブとして15mg)(1錠中)	ボナチニブとして45mgを1日1回経口投与、適宜減量[前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病、再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病](抗悪性腫瘍剤/チロシinkinゼインヒター)	4291
245.60	後(外) 局	アイケア点眼液0.1%	(0.1%5mL1瓶)	科研製薬(テिका製薬、科研製薬)	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム(角結膜上皮障害治療用点眼剤)	1回1滴、1日5~6回点眼し、適宜増減、通常は0.1%製剤を投与	1319
328.40	後(外) 局	アイケア点眼液0.3%	(0.3%5mL1瓶)	科研製薬(テिका製薬、科研製薬)	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム3mg(1mL中)	1回1滴、1日5~6回点眼、適宜増減、重症疾患等で効果不十分の場合には0.3%製剤を投与(角結膜上皮障害治療用点眼剤)	1319
6.40	後	アイスフラット懸濁用配合顆粒	(1g)	長生堂製薬(日本ジェネリック)	制酸剤	乾燥水酸化アルミニウムゲル448mg(酸化アルミニウムとして224mg)、水酸化マグネシウム400mg(1g中)	1日1.6~4.8gを数回に分割、用時1gを約10mLの水に懸濁又はそのまま経口投与(消化性潰瘍・胃炎治療剤)	2349
1,553.60	先①(劇) 処	アイセントレス錠400mg	(400mg1錠)	MSD	抗ウイルス剤	ラルテグラビルカリウム錠	ラルテグラビルとして400mgを1日2回経口投与、食事の有無にかかわらず投与可、必ず他の抗HIV薬と併用(HIV感染症)(HIVインテグラーゼ阻害剤)	6250
84.80	後(外)	アイドロイチン1%点眼液(1%5mL1瓶)		参天製薬	眼科用剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム10mg(1mL中)	1日2~4回、1回1~2滴点眼[角膜表層の保護](角膜保護点眼剤)	1319
87.20	後(外)	アイドロイチン3%点眼液(3%5mL1瓶)		参天製薬	眼科用剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム30mg(1mL中)	1日2~4回、1回1~2滴点眼[角膜表層の保護]	1319
9.90	先②(劇) 局	アイトロール錠10mg	(10mg1錠)	トーアエイヨー(アステラス)	血管拡張剤	一硝酸イソソルビドとして1回20mg1日2回を経口投与、適宜増減、効果不十分時1回40mg1日2回迄増量可、労作狭心症又は労作兼安静狭心症で発作回数及び運動耐容能の面で重症:1回40mg1日2回投与可(狭心症治療用ISMN製剤)	2171	
13.50	先②(劇) 局	アイトロール錠20mg	(20mg1錠)	トーアエイヨー(アステラス)	血管拡張剤	一硝酸イソソルビドとして1回20mg1日2回を経口投与、適宜増減、効果不十分時1回40mg1日2回迄増量可、労作狭心症又は労作兼安静狭心症で発作回数及び運動耐容能の面で重症:1回40mg1日2回投与可(狭心症治療用ISMN製剤)	2171	
32.90	先②	アイピーディカプセル50	(50mg1カプセル)	大鵬薬品	アレルギー用剤	スプラタストシル酸塩として1回100mgを1日3回毎食後に経口投与、適宜増減[気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎](アレルギー性疾患治療剤)	4490	
38.00	先②	アイピーディカプセル100	(100mg1カプセル)	大鵬薬品	アレルギー用剤	スプラタストシル酸塩として1回100mgを1日3回毎食後に経口投与、適宜増減(アレルギー性疾患治療剤)	4490	
46.90	先①	アイピーディドライシロップ5%	(5%1g)	大鵬薬品	アレルギー用剤	スプラタストシル酸塩として気管支喘息:小児には1回3mg/kgを1日2回朝食後・夕食後に用時溶解して経口投与、適宜増減、1日投与量は成人通常1日用量300mg(ドライシロップとして6g)を超えない、標準投与量はドライシロップとして1回量3歳以上5歳未満:0.75g、5歳以上11歳未満:1.5g、11歳以上:2.0g、1日2回朝食後及び夕食後、用時溶解	4490	
448.90	先①(外) 処	アイファガン点眼液0.1%	(0.1%1mL)	千寿製薬(武田薬品)	眼科用剤	プリモニジン酒石酸塩1mg(1mL中)	緑内障・高眼圧症で他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合:1回1滴、1日2回点眼(ドレナリンα2受容体作動薬 緑内障・高眼圧症治療剤)	1319
132.80	先①(劇) 処	アイミクス配合錠HD	(1錠)	大日本住友(大日本住友、塩野義)	血圧降下剤	イルベサルタン100mg・アムロジピン10mg(アムロジピンベシル酸塩13.87mg)(1錠中)	高血圧症:成人1日1回1錠を経口投与、本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない(長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤)	2149
115.80	先①(劇) 処	アイミクス配合錠LD	(1錠)	大日本住友(大日本住友、塩野義)	血圧降下剤	イルベサルタン100mg・アムロジピン5mg(アムロジピンベシル酸塩6.93mg)(1錠中)	高血圧症:成人1日1回1錠を経口投与、本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない	2149

## アリ(内・外・歯)

薬価	区分	品名 (規格単位)	メーカー	薬効	用法	用量	分類
35.10	後劇処 統	アリピラゾール散1%「日医工」 (1%1g)	日医工	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分け経口投与、適宜増減、1日量は30mgを超えない(抗精神病薬)		1179
35.10	後劇処 統	アリピラゾール散1%「ニプロ」 (1%1g)	ニプロ	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分け経口投与、適宜増減、1日量は30mgを超えない(抗精神病薬)		1179
49.80	後劇処 統	アリピラゾール散1%「明治」 (1%1g)	MeijiSeikaファルマ	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分け経口投与、適宜増減、1日量は30mgを超えない(抗精神病薬)		1179
49.80	後劇処 統	アリピラゾール散1%「ヨシトミ」 (1%1g)	ニプロESファーマ	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分け経口投与、適宜増減、1日量は30mgを超えない(抗精神病薬)		1179
15.70	後劇処 統	アリピラゾール3mg錠(1) (3mg1錠)	統一名取載品	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
15.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「アメル」 (3mg1錠)	共和薬品	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
15.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「オーハラ」 (3mg1錠)	大原薬品(大原、共創未来ファーマ)	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
21.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「サワイ」 (3mg1錠)	沢井製薬	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
21.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「タカタ」 (3mg1錠)	高田製薬	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
21.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「トーワ」 (3mg1錠)	東和薬品	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
15.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「日医工」 (3mg1錠)	日医工	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
15.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「ニプロ」 (3mg1錠)	ニプロ	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
21.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「明治」 (3mg1錠)	MeijiSeikaファルマ	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
15.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「ヨシトミ」 (3mg1錠)	ニプロESファーマ	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
21.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「JG」 (3mg1錠)	日本ジェネリック	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
15.70	後劇処 統	アリピラゾール錠3mg「YD」 (3mg1錠)	陽進堂	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
29.80	後劇処 統	アリピラゾール6mg錠(1) (6mg1錠)	統一名取載品	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
29.80	後劇処 統	アリピラゾール錠6mg「アメル」 (6mg1錠)	共和薬品	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
29.80	後劇処 統	アリピラゾール錠6mg「オーハラ」 (6mg1錠)	大原薬品(大原、共創未来ファーマ)	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
29.80	後劇処 統	アリピラゾール錠6mg「サワイ」 (6mg1錠)	沢井製薬	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179
42.20	後劇処 統	アリピラゾール錠6mg「タカタ」 (6mg1錠)	高田製薬	精神神経用剤	アリピラゾールとして統合失調症:1日6~12mgを開始用量、1日6~24mgを維持用量、1回又は2回に分割経口投与		1179

## シコ(内・外・歯)

薬価	区分	品名	(規格単位)	メーカー	薬効	用法	用量	分類
9.60	局(劇)処	ジゴキシン錠0.0625「KYO」	(0.0625mg1錠)	京都薬品(トーアエイヨー、アステラス)	強心剤	ジゴキシンとして成人維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与、通常小児に対して急速飽和療法:2歳以下:1日0.06~0.08mg/kgを3~4分服、2歳以上:1日0.04~0.06mg/kgを3~4分服、維持療法:飽和量の1/5~1/3量を経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴキシン錠	(0.125mg1錠)	局方品	強心剤	ジゴキシンとして通常成人:維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与、小児:急速飽和療法:2歳以下:1日0.06~0.08mg/kg、2歳以上:1日0.04~0.06mg/kgを3~4回に分割経口投与、維持療法:飽和量の1/5~1/3量を経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴキシン錠0.125mg「AFP」	(0.125mg1錠)	アルフレッサファーマ	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ハーフジゴキシンKY錠0.125	(0.125mg1錠)	京都薬品(トーアエイヨー、アステラス)	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)[帯黄白色素錠(割線入り)]	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴキシン錠0.125mg「NP」	(0.125mg1錠)	ニプロ	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴキシン錠	(0.25mg1錠)	局方品	強心剤	ジゴキシンとして通常成人に対して急速飽和療法(飽和量:1.0~4.0mg):初回0.5~1.0mg、以後0.5mgを6~8時間ごとに経口投与し十分効果のあらわれるまで続ける、比較的急速飽和療法を行うことができる、緩徐飽和療法を行うことができる、維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	(0.25mg1錠)	アルフレッサファーマ	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴキシンKY錠0.25	(0.25mg1錠)	京都薬品(トーアエイヨー、アステラス)	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴキシン錠0.25mg「NP」	(0.25mg1錠)	ニプロ	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
14.80	劇)処	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL	(0.005%10mL)	太陽ファルマ	強心剤	ジゴキシンとして通常小児に対して急速飽和療法:2歳以下:1日0.06~0.08mg/kgを3~4分服、2歳以上:1日0.04~0.06mg/kgを3~4分服、維持療法:飽和量の1/5~1/3量を経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
10.10	劇)処	ジゴシン散0.1%	(0.1%1g)	太陽ファルマ	強心剤	ジゴキシンとして通常成人に対して急速飽和療法(飽和量:1.0~4.0mg):初回0.5~1.0mg、以後0.5mgを6~8時間ごとに経口投与し十分効果のあらわれるまで続ける、比較的急速飽和療法を行うことができる、緩徐飽和療法を行うことができる、維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴシン錠0.125mg	(0.125mg1錠)	太陽ファルマ	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
9.60	局(劇)処	ジゴシン錠0.25mg	(0.25mg1錠)	太陽ファルマ	強心剤	ジゴキシンとして維持療法:1日0.25~0.5mgを経口投与(ジギタリス配糖体製剤)	2113	
21.40	局	ジコッピ	(10g)	局方品	生薬	ジコッピ	5100	
31.20	局	シコン	(10g)	局方品	生薬	シコン	5100	
31.20	局	シコンダイコーM	(10g)	大晃生薬	生薬	シコン	5100	
8.20	後(劇)経	シーサール散10%	(10%1g)	東和薬品	鎮咳剤	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物として1回15~30mgを1日1~4回経口投与、適宜増減	2223	
5.60	後(経)	シーサール錠15mg	(15mg1錠)	東和薬品	鎮咳剤	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物として1回15~30mgを1日1~4回経口投与、適宜増減	2223	
9.80	局	次硝酸ビスマス「ケンエー」	(1g)	健栄製薬	止瀉・整腸剤	次硝酸ビスマス 1日2g、2~3分服(下痢症)	2315	
8.30	局	次硝酸ビスマス「三恵」	(1g)	三恵薬品	止瀉・整腸剤	次硝酸ビスマス 1日2g、2~3分服(下痢症)	2315	
9.80	局	次硝酸ビスマス シオエ	(1g)	シオエ製薬(日本新薬)	止瀉・整腸剤	次硝酸ビスマス 1日2g、2~3分服(下痢症)	2315	
9.80	局	次硝酸ビスマス「東海」	(1g)	東海製薬	止瀉・整腸剤	次硝酸ビスマス 1日2g、2~3分服(下痢症)	2315	
8.30	局	次硝酸ビスマス「日医工」	(1g)	日医工ファーマ(日医工)	止瀉・整腸剤	次硝酸ビスマス 1日2g、2~3分服(下痢症)	2315	
9.80	局	次硝酸ビスマス「ニッコー」	(1g)	日興製薬(日興、吉田、丸石、ニプロ)	止瀉・整腸剤	次硝酸ビスマス 1日2g、2~3分服(下痢症)	2315	

ソフ(内・外・菌)

薬価	区分	品名	(規格単位)	メーカー	薬効	用法	用量	分類
55.10	外	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚)	テイカ製薬	外用抗生物質製剤	フラジオマイシン硫酸塩	10.8mg(力価)(1枚中)1~数枚を直接患部に当て、その上を無菌ガーゼで覆う(外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染)	2634
138.30	外	ソフラチュール貼付剤30cm	((32.4mg)10cm×30cm1枚)	テイカ製薬	外用抗生物質製剤	フラジオマイシン硫酸塩	32.4mg(力価)(1枚中)1~数枚を直接患部に当て、その上を無菌ガーゼで覆う[黄白色の軟膏を均等に付着浸透させた目の粗い木綿ガーゼ]	2634
1,067.00	先①制 処経	ゾフランザイディス4	(4mg1錠)	ノバルティス	制吐剤	オンダンセトロンを1回4mg、1日1回経口投与、適宜増量。錠剤が服用しにくい場合や水分摂取制限が必要な場合(本剤は自動分包機には適さない)(凍結乾燥により製造した白色の錠剤でわずかにストロベリーの芳香)(制吐剤)		2391
280.30	先①制 処経	ゾフラン小児用シロップ0.05%	(0.05%1mL)	ノバルティス	制吐剤	オンダンセトロン塩酸塩水和物 小児に1日1回オンダンセトロンとして2.5mg/m2投与、適宜増減、最大1回4mg(シロップとして8mL)(抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状の改善)		2391
815.30	先①制 処経	ゾフラン錠2	(2mg1錠)	ノバルティス	制吐剤	オンダンセトロン塩酸塩水和物 オンダンセトロンとして1回4mg1日1回経口投与、適宜増減、効果不十分な場合同用量の注射液を投与可[抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)]		2391
1,058.90	先①制 処経	ゾフラン錠4	(4mg1錠)	ノバルティス	制吐剤	オンダンセトロン塩酸塩水和物 オンダンセトロンとして1回4mg1日1回経口投与、適宜増減、効果不十分な場合同用量の注射液を投与可		2391
13,005.30	先①制 処	ソブリアードカプセル100mg	(100mg1カプセル)	ヤンセンファーマ	抗ウイルス剤	シメプレビルナトリウム102.93mg(シメプレビルとして100mg)(1カプセル中)シメプレビルとして成人には100mgを1日1回経口投与、投与期間は12週間、ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)又はペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンと併用すること[ジェノタイプ1型C型慢性肝炎治療薬]		6250
5.60	後 局	ソプレロール錠10mg	(10mg1錠)	日新製薬	血管拡張剤	一硝酸イソソルビドとして1回20mg1日2回を経口投与、適宜増減、効果不十分時1回40mg1日2回迄増量可、労作狭心症又は労作兼安静狭心症で発作回数及び運動耐容能の面で重症:1回40mg1日2回投与可(狭心症治療用ISMN製剤)		2171
7.60	後 局	ソプレロール錠20mg	(20mg1錠)	日新製薬(日新製薬、日本ジェネリック)	血管拡張剤	一硝酸イソソルビドとして1回20mg1日2回を経口投与、適宜増減、効果不十分時1回40mg1日2回迄増量可、労作狭心症又は労作兼安静狭心症で発作回数及び運動耐容能の面で重症:1回40mg1日2回投与可(狭心症治療用ISMN製剤)		2171
28.60	局	ソボク	(10g)	局方品	生薬	ソボク		5100
730.30	先②制 処	ゾーミッグ錠2.5mg	(2.5mg1錠)	アストラゼネカ	血管収縮剤	ゾルミトリプタンとして1回2.5mgを片頭痛発現時投与、追加投与2時間以上あける、2.5mg効果不十分時次回から5mg投与可、1日総投与量10mg以内(片頭痛治療薬/5-HT1B/1D受容体作動薬)		2160
730.30	先②制 処	ゾーミッグRM錠2.5mg	(2.5mg1錠)	アストラゼネカ	血管収縮剤	ゾルミトリプタン口腔内速溶錠 ゾルミトリプタンとして1回2.5mgを片頭痛発現時投与、追加投与2時間以上あける、2.5mg効果不十分時次回から5mg投与可、1日総投与量10mg以内		2160
27.10	先①向 処	ソメリン細粒1%	(1%1g)	第一三共	催眠鎮静抗不安剤	ハロキサゾラムとして成人1回5~10mg就寝前に経口投与(睡眠導入剤)		1124
17.20	先①向 処	ソメリン錠5mg	(5mg1錠)	第一三共	催眠鎮静抗不安剤	ハロキサゾラムとして成人1回5~10mg就寝前に経口投与		1124
25.60	先①向 処	ソメリン錠10mg	(10mg1錠)	第一三共	催眠鎮静抗不安剤	ハロキサゾラムとして成人1回5~10mg就寝前に経口投与		1124
24.90	局	ソヨウ	(10g)	局方品	生薬	ソヨウ		5100
24.90	局	ソヨウダイコーM	(10g)	大晃生薬	生薬	ソヨウ		5100
7.90	先②向 処	ソラナックス0.4mg錠	(0.4mg1錠)	ファイザー	催眠鎮静抗不安剤	アルプラゾラムとして1日1.2mgを3回に分けて投与、適宜増減、最高用量1日2.4mgとして漸次増量3~4回に分けて、高齢者では1回0.4mgの1日1~2回投与から開始1日1.2mgを超えない		1124
2018年3月14日 薬価基準追補収載時点の薬価(4月1日以降に薬価改定される場合があります)								
1507.50	先 処	ゾフルーザ錠10mg	(10mg1錠)	塩野義製薬	抗インフルエンザウイルス剤	パロキサビル マルボキシルとして成人及び12歳以上の小児:40mg(20mg錠2錠)、体重80kg以上の患者:80mg(20mg錠4錠)を単回経口投与、12歳未満小児:体重40kg以上:20mg錠2錠、20kg以上40kg未満:20mg錠1錠、10kg以上20kg未満:10mg錠1錠を単回経口投与		6250
2394.50	先 処	ゾフルーザ錠20mg	(20mg1錠)	塩野義製薬				

テオ(内・外・歯)

薬価	区分	品名	(規格単位)	メーカー	薬効	用法	用量	分類
5.60	後(効)	テオフィリン徐放錠100mg	「サワイ」 (100mg1錠)	沢井製薬	気管支拡張剤	テオフィリンとして1回200mgを、小児1回100~200mgを、1日2回朝・就寝前経口投与、気管支喘息については成人1回400mg1日1回就寝前経口投与可〔気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺炎腫〕		2251
5.60	後(効)	テオフィリン徐放錠100mg	「日医工」 (100mg1錠)	日医工	気管支拡張剤	テオフィリンとして1回200mgを、小児1回100~200mgを、1日2回朝・就寝前経口投与、気管支喘息については成人1回400mg1日1回就寝前経口投与可〔気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺炎腫〕		2251
5.80	後(効)	テオフィリン徐放錠200mg	「サワイ」 (200mg1錠)	沢井製薬	気管支拡張剤	テオフィリンとして成人1回200mgを1日2回朝・就寝前投与、気管支喘息については成人1回400mg(本剤2錠)を1日1回就寝前投与可		2251
5.80	後(効)	テオフィリン徐放錠200mg	「日医工」 (200mg1錠)	日医工	気管支拡張剤	テオフィリンとして成人1回200mgを1日2回朝・就寝前投与、気管支喘息については成人1回400mg(本剤2錠)を1日1回就寝前投与可		2251
48.40	後(効)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%	「サワイ」 (20%1g)	沢井製薬	気管支拡張剤	テオフィリンとして小児に1回4~8mg/kg(本剤20~40mg/kg)を1日2回朝・就寝前経口投与、通常用時水に懸濁投与、顆粒のまま投与可		2251
31.20	後(効)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%	「日医工」 (20%1g)	日医工	気管支拡張剤	テオフィリンとして小児に1回4~8mg/kg(本剤20~40mg/kg)を1日2回朝・就寝前経口投与、通常用時水に懸濁投与、顆粒のまま投与可		2251
48.40	後(効)	テオフィリン徐放DS小児用20%	「トーワ」 (20%1g)	東和薬品	気管支拡張剤	テオフィリンとして小児に1回4~8mg/kg(本剤20~40mg/kg)を1日2回朝・就寝前経口投与、通常用時水に懸濁投与、顆粒のまま投与可		2251
5.60	後(効)	テオフィリン徐放U錠100mg	「トーワ」 (100mg1錠)	東和薬品	気管支拡張剤	テオフィリンとして400mgを1日1回夕食後経口投与〔気管支喘息、慢性気管支炎、肺炎腫〕		2251
5.80	後(効)	テオフィリン徐放U錠200mg	「トーワ」 (200mg1錠)	東和薬品	気管支拡張剤	テオフィリンとして400mgを1日1回夕食後に経口投与、適宜増減〔気管支喘息、慢性気管支炎、肺炎腫〕(キサンチン系気管支拡張剤)		2251
6.60	後(効)	テオフィリン徐放U錠400mg	「トーワ」 (400mg1錠)	東和薬品	気管支拡張剤	テオフィリンとして400mgを1日1回夕食後に経口投与、適宜増減(キサンチン系気管支拡張剤)		2251
31.20	後(効)	テオフィリンドライシロップ20%	「タカタ」 (20%1g)	高田製薬	気管支拡張剤	テオフィリンとして小児に1回4~8mg/kg(本剤20~40mg/kg)を1日2回朝・就寝前経口投与、通常用時水に懸濁投与、顆粒のまま投与可		2251
34.90	後(効)	テオロング顆粒50%	(50%1g)	エーザイ	気管支拡張剤	テオフィリンとして成人1回200mg、小児1回100~200mgを1日2回朝及び就寝前経口投与、適宜増減(テオフィリン徐放製剤)		2251
5.90	後(効)	テオロング錠50mg	(50mg1錠)	エーザイ	気管支拡張剤	テオフィリンとして成人1回200mg、小児1回100~200mgを1日2回朝及び就寝前経口投与、適宜増減(徐放性製剤)		2251
10.70	★(効)	テオロング錠100mg	(100mg1錠)	エーザイ	気管支拡張剤	テオフィリンとして成人1回200mg、小児1回100~200mgを1日2回朝及び就寝前経口投与、適宜増減(徐放性製剤)		2251
16.20	★(効)	テオロング錠200mg	(200mg1錠)	エーザイ	気管支拡張剤	テオフィリンとして成人1回200mgを1日2回、朝及び就寝前投与、気管支喘息については成人1回400mg(本剤2錠)を、1日1回就寝前投与可(テオフィリン徐放製剤)		2251
252.80	外(効)	テーカイン原末	(1g)	ナガセ医薬品 (ファイザー)	局所麻酔剤	パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩 使用に際し、目的濃度の水性注射液または水性液として使用(局所麻酔剤)		1211
4.20	準(効)	デカドロンエリキシル0.01%	(0.01%1mL)	日医工	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンとして成人1日0.5~8mg(本剤5~80mL)を1~4回に分経口投与、小児:1日0.15~4mg(本剤1.5~40mL)を1~4回に分経口投与、適宜増減		2454
5.60	(効)	デカドロン錠0.5mg	(0.5mg1錠)	日医工	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンとして通常成人1日0.5~8mgを1~4回に分経口投与、適宜増減、抗悪性腫瘍剤(シスプラチンなど)投与に伴う消化器症状(悪心・嘔吐)の場合:成人1日4~20mgを1~2回に分経口投与、1日最大20mg迄〔副腎皮質ホルモン製剤〕		2454
33.60	(効)	デカドロン錠4mg	(4mg1錠)	日医工	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンとして通常成人1日0.5~8mgを1~4回に分経口投与、適宜増減、抗悪性腫瘍剤(シスプラチンなど)投与に伴う消化器症状(悪心・嘔吐)の場合:成人1日4~20mgを1~2回に分経口投与、1日最大20mg迄〔副腎皮質ホルモン製剤〕		2454

薬価	区分	品名	(規格単位)	メーカー	薬効	用法	用量	分類
27.20	後(処)統	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド錠(1)	(1錠)	統一名収載品	血圧降下剤	テルミサルタン40mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない(高血圧症)	2149
49.60	後(処)	テルチア配合錠AP「サワイ」	(1錠)	沢井製薬	血圧降下剤	テルミサルタン40mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない(高血圧症)	2149
49.60	後(処)	テルチア配合錠AP「武田テバ」	(1錠)	武田テバファーマ(武田薬品)	血圧降下剤	テルミサルタン40mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない(高血圧症)	2149
49.60	後(処)	テルチア配合錠AP「トーウ」	(1錠)	東和薬品(東和、ニプロ)	血圧降下剤	テルミサルタン40mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない(高血圧症)	2149
27.20	後(処)統	テルチア配合錠AP「日医工」	(1錠)	日医工	血圧降下剤	テルミサルタン40mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない(高血圧症)	2149
49.60	後(処)	テルチア配合錠AP「DSEP」	(1錠)	第一三共エスファ	血圧降下剤	テルミサルタン40mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない(高血圧症)(胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック/利尿薬合剤)	2149
40.40	後(処)統	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド錠(2)	(1錠)	統一名収載品	血圧降下剤	テルミサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない	2149
72.00	後(処)	テルチア配合錠BP「サワイ」	(1錠)	沢井製薬	血圧降下剤	テルミサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない	2149
72.00	後(処)	テルチア配合錠BP「武田テバ」	(1錠)	武田テバファーマ(武田薬品)	血圧降下剤	テルミサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない	2149
72.00	後(処)	テルチア配合錠BP「トーウ」	(1錠)	東和薬品(東和、ニプロ)	血圧降下剤	テルミサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない	2149
40.40	後(処)統	テルチア配合錠BP「日医工」	(1錠)	日医工	血圧降下剤	テルミサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない	2149
72.00	後(処)	テルチア配合錠BP「DSEP」	(1錠)	第一三共エスファ	血圧降下剤	テルミサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg(1錠中)	高血圧症:1日1回1錠を経口投与、高血圧治療の第一選択薬として用いない	2149
6,119.10	先(1)創(処)	デルティバ錠50mg	(50mg1錠)	大塚製薬	抗結核剤	デラマニドとして多剤耐性肺結核:1回100mgを1日2回朝・夕に食後経口投与[結核化学療法剤]		6222
9.30	後(外)創	デルトピカ軟膏0.05%	(0.05%1g)	岩城製薬	副腎皮質ホルモン剤	クロバタゾールプロピオン酸エステル0.5mg(1g中)(白色～微黄色半透明の油性の軟膏剤)1日1～数回適量塗布		2646
7.40	後(外)創(統)	デルトピカローション0.05%	(0.05%1g)	岩城製薬	副腎皮質ホルモン剤	クロバタゾールプロピオン酸エステル0.5mg(1g中)(白色のローション剤)(主として頭部の皮膚疾患 湿疹・皮膚炎群、乾癬)1日1～数回適量を塗布		2646
29.10	先(2)創	テルネリン顆粒0.2%	(0.2%1g)	サンファーマ(田辺三菱製薬)	鎮けい剤	チザニジン塩酸塩 チザニジンとして3mg(痙性麻痺の場合効果をみながら1日6～9mg迄漸増)を1日3回食後に分割経口投与、適宜増減(筋緊張緩和剤)		1249
13.80	先(2)創	テルネリン錠1mg	(1mg1錠)	サンファーマ(田辺三菱製薬)	鎮けい剤	チザニジン塩酸塩 チザニジンとして3mg(痙性麻痺の場合効果をみながら1日6～9mg迄漸増)を1日3回食後に分割経口投与、適宜増減(筋緊張緩和剤)		1249
48.40	後(創)創	テルバンスDS20%	(20%1g)	メディサ新薬(エルメッドエーザイ)	気管支拡張剤	テオフィリンとして小児に1回4～8mg/kg(本剤20～40mg/kg)を1日2回朝・就寝前経口投与、通常用時水に懸濁投与、顆粒のまま投与も可		2251
5.90		デルパント配合顆粒	(1g)	陽進堂	混合ビタミン剤	パントテン酸カルシウム100mg、リポフラビン3mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド15mg(1g中)1日0.5～2.0gを1～3回に分割経口投与		3179

レス(内・外・歯)

薬価	区分	品名	(規格単位)	メーカー	薬効	用法	用量	分類
318.00	先②(外)	レスキュラ点眼液0.12%	(0.12%1mL)	スキャンポファーマ(参天製薬)	眼科用剤	イソプロピル ウノプロストン点眼液	緑内障・高眼圧症:1回1滴、1日2回点眼(イオンチャネル開口薬 緑内障・高眼圧症治療剤)	1319
18.00	先①(処)局	レスタス錠2mg	(2mg1錠)	日本ジェネリック	催眠鎮静抗不安剤	フルトプラゼパムとして	1日2~4mgを1~2回に分経口投与、適宜増減、高齢者1日4mg迄(持続性心身安定剤)	1124
15.70	(外)	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	(1g)	興和(興和創薬)	皮膚疾患治療剤	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	10mg、フラジマイシン硫酸塩3.5mg(力価)、ジフェンヒドラミン塩酸塩1mg(1g中) 1日1~数回直接患部に塗布・塗擦・無菌ガーゼ等にてのぼして貼付(炎症性・アレルギー性・細菌性皮膚疾患治療剤)	2649
7.50	局	ネオレスタミンコーワ散1%	(1%1g)	興和(興和創薬)	抗ヒスタミン剤	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩として	1日2~6mgを1日2~4回経口投与、適宜増減	4419
5.80		レスタミンコーワ錠10mg	(10mg1錠)	興和(興和創薬)	抗ヒスタミン剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩として	1日30~50mgを1日2~3回経口投与(アレルギー性疾患治療剤)	4411
29.50	(外)	レスタミンコーワクリーム1%	(1%10g)	興和(興和創薬)	外用抗ヒスタミン剤	ジフェンヒドラミン10mg(1g中)白色・乳剤性軟膏	適量を、1日数回患部に塗布または塗擦(アレルギー性疾患外用治療剤)	2642
5.80	先①	レスプレ錠5mg	(5mg1錠)	太陽ファルマ	鎮咳去痰剤	エブラジノン塩酸塩として	1日60~90mg、3歳以上6歳未満20~30mg、6歳以上10歳未満30~45mg、を1日3回分割経口投与(鎮咳・気道粘液溶解剤)	2249
5.80	先①	レスプレ錠20mg	(20mg1錠)	太陽ファルマ	鎮咳去痰剤	エブラジノン塩酸塩として	成人1日量60~90mgを1日3回分割経口投与(鎮咳・気道粘液溶解剤)	2249
6.40	先①	レスプレ錠30mg	(30mg1錠)	太陽ファルマ	鎮咳去痰剤	エブラジノン塩酸塩として	成人1日量60~90mgを1日3回分割経口投与(鎮咳・気道粘液溶解剤)	2249
5.90	後	レスポリックス配合顆粒	(1g)	鶴原製薬	消化性潰瘍用剤	ジサイクロミン塩酸塩5mg・乾燥水酸化アルミニウムゲル400mg・酸化マグネシウム200mg(1g中)	1回1~2gを1日3~4回	2329
5.60	☆(向) (処)	レスミット錠2	(2mg1錠)	塩野義製薬(共和薬品)	催眠鎮静抗不安剤	メダゼパムとして	1日10~30mgを経口投与(抗不安剤)	1124
5.60	☆(向) (処)	レスミット錠5	(5mg1錠)	塩野義製薬(共和薬品)	催眠鎮静抗不安剤	メダゼパムとして	1日10~30mgを経口投与(抗不安剤)	1124
15.00	先②(劇) (処)	レスリン錠25	(25mg1錠)	MSD	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩として	1日75~100mgを初期用量とし、1日200mg迄増量し、1~数回に分経口投与、適宜増減(うつ病・うつ状態治療剤)	1179
26.20	先②(劇) (処)	レスリン錠50	(50mg1錠)	MSD	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩として	1日75~100mgを初期用量とし、1日200mg迄増量し、1~数回に分経口投与、適宜増減(うつ病・うつ状態治療剤)	1179
8.10	局(劇) (処)	レセルピン散0.1%	(0.1%1g)	局方品	血圧降下剤	レセルピンとして	降圧:1日0.2~0.5mgを1~3分服、維持量:1日0.1~0.25mg、適宜増減(高血圧症治療剤、精神神経疾患治療剤)	2143
9.60	局(処)	レセルピン錠	(0.25mg1錠)	局方品	血圧降下剤	レセルピンとして	フェノチアジン系薬物の使用困難な統合失調症:1日0.2~2mgより開始、患者の反応を観察しつつ、適宜増減	2143
177.60	後(外)	レゾルシン「純生」	(10g)	小堺製薬(日興製薬)	外用殺菌消毒剤	レゾルシン	2~5%軟膏、水溶液、ローションとして1日1~2回塗布	2619
23.90	(外)	レダコートクリーム0.1%	(0.1%1g)	アルフレッサファーマ	副腎皮質ホルモン剤	トリアムシノロンアセトニド1mg(1g中)(白色のクリーム剤)	1日2~3回適量を患部に塗布(合成副腎皮質ホルモン外用剤)	2646
21.20	(処)	レダコート錠4mg	(4mg1錠)	アルフレッサファーマ	副腎ホルモン剤	トリアムシノロンとして	1日4~48mg(1~12錠)を1~4回に分経口投与、適宜増減	2454
23.90	(外)	レダコート軟膏0.1%	(0.1%1g)	アルフレッサファーマ	副腎皮質ホルモン剤	トリアムシノロンアセトニド1mg(1g中)(微黄色の軟膏剤)	1日2~3回適量を患部に塗布	2646
18.40	(処)	レダマイシンカプセル150mg	(150mg1カプセル)	ポーラファルマ	抗生物質製剤	デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩として	1日450~600mg(力価)を2~4回に分経口投与	6152
5.60	後(局)	レチコラン錠250μg	(0.25mg1錠)	東菱薬品(日医工)	ビタミンB <sub>12</sub> 剤	メコバラミンとして	1日1500μgを3回に分けて経口投与、適宜増減(末梢性神経障害治療剤)	3136

【ア】

先①㊦動注用アイエコール50mg(50mg1瓶)	日本化薬	46,837.00	後周アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 (250mg100mL1袋)	共和クリティケア(扶桑薬品、共和クリティケア)	912.00
先①㊦動注用アイエコール100mg(100mg1瓶)	日本化薬	85,706.00	後㊦統アシクロビル250mg注射用(250mg1瓶)	統一名取載品	487.00
㊦㊦注射用アイオナール・ナトリウム(0.2) (200mg1瓶)日医工		226.00	後周アシクロビル点滴静注用250mg「アイロム」 (250mg1瓶)共和クリティケア		535.00
先②アイソボリン点滴静注用25mg(25mg1瓶)	ファイザー	1,908.00	後周アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 (250mg1瓶)沢井製薬		535.00
先②アイソボリン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	ファイザー	6,513.00	後㊦統アシクロビル点滴静注用250mg「トロー」 (250mg1瓶)東和薬品		487.00
先①㊦㊦アイリーア硝子体内注射液40mg/mL (2mg0.05mL1瓶)バイエル薬品(参天製薬)		138,653.00	後周アシクロビル点滴静注用250mg「PP」(250mg1瓶) ポーラファルマ		535.00
先①㊦㊦アウドラザイム点滴静注液2.9mg (2.9mg5mL1瓶)サノフィ		114,554.00	後周アシクロビル点滴静注用250mg「SN」(250mg1瓶) シオノケミカル(ファイザー)		535.00
㊦㊦アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)大日本住友 後周アクチオス点滴静注用250mg(250mg1瓶)	武田テバファーマ(武田薬品)	535.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液 (100mg1管)局方品		82.00
☆アクチット輸液 (200mL1瓶)扶桑薬品		160.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液100mg「サワイ」(100mg1管)	沢井製薬	82.00
☆アクチット輸液 (200mL1袋)扶桑薬品		160.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」 (100mg1管)鶴原製薬		82.00
☆アクチット輸液 (500mL1瓶)扶桑薬品		195.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液100mg「日医工」(100mg1管)	日医工	82.00
☆アクチット輸液 (500mL1袋)扶桑薬品		195.00	㊦㊦アスコルビン酸注100mg「NP」 (100mg1管)ニプロ		82.00
先①㊦㊦アクチバシン注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))協和発酵キリン		45,850.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液100mg「トロー」(100mg1管)	東和薬品	82.00
先①㊦㊦アクチバシン注1200万 (1,200万国際単位1瓶(溶解液付))協和発酵キリン		93,907.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液 (200mg1管)局方品		82.00
先①㊦㊦アクチバシン注2400万 (2,400万国際単位1瓶(溶解液付))協和発酵キリン		189,338.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液 (500mg1管)局方品		82.00
先①㊦㊦アクテムラ点滴静注用80mg(80mg4mL1瓶)	中外製薬	18,592.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」(500mg1管)	沢井製薬	82.00
先①㊦㊦アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)中外製薬		45,807.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液500mg「ツルハラ」 (500mg1管)鶴原製薬		82.00
先①㊦㊦アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)中外製薬		90,611.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液500mg「トロー」(500mg1管)	東和薬品	82.00
先①㊦㊦アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0.9mL1キット)中外製薬		39,291.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液500mg「日医工」(500mg1管)	日医工	82.00
先①㊦㊦アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)中外製薬		39,143.00	後周アスコルビン酸注500mgPB「日新」(500mg1管) 日新製薬(日新製薬、富士フィルムファーマ)		56.00
先①㊦㊦アクトシン注射用300mg(300mg1管(溶解液付)) 第一三共		1,108.00	㊦㊦アスコルビン酸注500mg「NP」 (500mg1管)ニプロ		82.00
先①㊦㊦アクブラ静注用10mg (10mg1瓶)日医工		4,851.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液 (1g1管)局方品		82.00
先①㊦㊦アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)日医工		22,310.00	㊦㊦アスコルビン酸注射液1000mg「トロー」(1g1管)	東和薬品	82.00
先①㊦㊦アクブラ静注用100mg (100mg1瓶)日医工		42,568.00	アステマリン3号MG輸液(500mL1瓶) マイラン製薬(ファイザー)		180.00
★アクマルト輸液 (200mL1袋)光製薬		168.00	アスバラカリウム注10mEq(17.12%10mL1管) ニプロESファーマ		60.00
★アクマルト輸液 (500mL1袋)光製薬		197.00	後アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 (17.12%10mL1キット)テルモ		175.00
アクメイン注 (200mL1袋)光製薬		163.00	後L-アスバラギン酸K点滴静注液10mEq「タイヨー」 (17.12%10mL1管)武田テバファーマ(武田薬品)		56.00
アクメイン注 (500mL1瓶)光製薬		193.00	後㊦統L-アスバラギン酸カリウム点滴静注液10mEq「トロー」 (17.12%10mL1管)東和薬品		56.00
アクメイン注 (500mL1袋)光製薬		193.00	後L-アスバラギン酸カリウム点滴静注液10mEq「日新」 (17.12%10mL1管)日新製薬		56.00
先①㊦㊦アクラシノン注射用20mg(20mg1瓶) 日本マイクロバイオ(アステラス)		3,118.00	アスバラ注射液 ((10%)10mL1管)田辺三菱製薬		60.00
先①㊦㊦アコアラシ静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付)) 協和発酵キリン(日本血液製剤機構)		32,558.00	後アスファージェン静注20mL (20mL1管)共和薬品		56.00
先①㊦㊦アコアラシ静注用1800 (1,800国際単位1瓶(溶解液付)) 協和発酵キリン(日本血液製剤機構)		84,035.00	先①㊦㊦アスペノン静注用100(100mg10mL1管)		
後周アザクタム注射用0.5g (500mg1瓶)エーザイ		907.00	バイエル薬品		785.00
先周アザクタム注射用1g (1g1瓶)エーザイ		1,374.00	後アスルダム配合注1mL (1mL1管)ニプロ		58.00
後アゼトロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」 (10mg2mL1管)武田テバファーマ(武田薬品)		3,192.00	後アスルダム配合注2mL (2mL1管)ニプロ		90.00
後アゼトロン塩酸塩静注液10mg「SN」 (10mg2mL1管)シオノケミカル(テルモ)		3,192.00	㊦㊦注射用アセチルコリン塩化物 (100mg1管(溶解液付))局方品		364.00
先①㊦㊦アシアロシンチ注 (10MBq)メジフィジックス		826.00	後アセテート維持液3G「HK」 (200mL1袋)光製薬		124.00
後㊦統アシクロビル250mg注射液(250mg1管)	統一名取載品	487.00	後アセテート維持液3G「HK」 (500mL1袋)光製薬		156.00
後㊦統アシクロビル点滴静注液250mg「トロー」 (250mg1管)東和薬品		487.00	後アセトキープ3G注 (200mL1袋)共和クリティケア		124.00
後周アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 (250mg1管)日医工		535.00	後アセトキープ3G注 (500mL1瓶)共和クリティケア		156.00
			先①㊦㊦アーゼラ点滴静注液100mg(100mg5mL1瓶) ノバルティス		28,378.00