

ニセルゴリン

nicergoline

サアミオン (田辺) : 錠 5mg, 散 1%

【適応 (効能・効果)】 脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害による意欲低下の改善

【用法・用量】 成人 : 1 日量 15mg, 分 3

【臨床成績】 意欲低下 : 29.9%, 精神症候 : 34.5%

【薬効薬理】 脳循環改善作用, 血液流動性改善作用, 脳エネルギー代謝改善作用, 脳神経機能改善作用, 脳波改善作用, 神経伝達系に対する作用 : 脳内コリンアセチルトランスフェラーゼ (CAT) 活性及びムスカリン性アセチルコリン受容体結合能回復, 海馬のアセチルコリン遊離回復, 脳内 AChE 活性阻害と海馬アセチルコリン量増加作用, ドーパミン代謝回転促進作用

【薬物動態】 (健康成人, 15mg) : C_{max} : 57 ~ 96ng eq./ml. Tmax : 2 ~ 4 時間

【薬物代謝】 尿中排泄率 51% (24 時間)

【禁忌】 禁忌 : 頭蓋内出血後, 止血が完成していないと考えられる患者

【副作用】 食欲不振 (0.39%), 下痢 (0.39%), 便秘 (0.29%) など

【妊婦・授乳婦】 妊婦 : 治療上の有益性 > 危険性のみ投与. 授乳禁止

【小児・高齢者】 小児等 : 安全性未確立, 高齢者 : 慎重投与 (減量)