

正誤表

1. 凡例 略語について

NSAIDs (誤) (non steroid anti-inflammatory drug) (正) (non steroid anti-inflammatory drug)

2. p. 87 ノイチーム【薬物動態】(誤) Cmax : 1700 µg/ml (正) Cmax : 1700pg/ml

3. p. 126 メイアクト、メイアクト MS

【禁忌】(誤) [錠のみ]牛乳アレルギー [メイアクトのみ]牛乳アレルギー

4. p. 583 オノン (小野) カプセル (誤) 12.5mg (正) 112.5mg

用法 : (誤) 1回4カプセル1日2回 (正) 1日4カプセル、分2

5. p. 726 レミケード 【用法・用量】(誤) 1回投与量 3mg/kg を初回 (正) 1回

投与量 : 関節リウマチの場合 3mg/kg、ベーチェット病の場合 5mg/kg を初回、

6. p. 899 イミグラン錠 50mg の用量 : 効果不十分の場合次回片頭痛発現時から

(誤) 10mg を投与 (正) 100mg を投与

7. p. 1062 表2. モルヒネ1日使用量に基づく切り替え用量

最終行 (誤) オキシコンチン 30mg/日からモルヒネ経口に変更する場合は・・・

(正) モルヒネ経口 30mg/日からオキシコンチンに変更する場合は・・・

8. p. 1067 商品名 (索引も訂正します)

(誤) オキシノーム (正) オキノーム

9. 索引

塩酸イリノテカン (誤) 716 ページ (正) 1017 ページ

本書に収載漏れの医薬品 (ダウンロードしてご利用ください)

- ・ PL 顆粒 (塩野義) ペレックス (大鵬)・・・1. 鎮痛・解熱薬
- ・ ベシケア錠 2.5mg、5mg (アステラス) デトルシトールカプセル 2mg,4mg (ファイザー)・・・46. 泌尿器・排尿障害・生殖器用薬
- ・ リタリン錠・・・48. 抗うつ薬
- ・ リーマス錠・・・48. 抗うつ薬
- ・ サアミオン錠 5mg、散1% (田辺)・・・54. 脳循環・代謝改善薬