

場所	誤	正
P128：2行目	間質性肺炎	間質性腎炎
p204：見出「1) 腸の不調と薬の働き」の下4行目	水分の吸収は大半が <u>大腸</u> で行われ	水分の吸収は大半が <u>小腸</u> で行われ
p229：7～9行	LDLが140mg/dL以上、 <u>血中コレステロール値が220mg/dL以上である状態</u> を脂質異常症（高脂血症）という。	LDLが140mg/dL以上、 <u>HDLが40mg/dL以下、中性脂肪が150mg/dL以上のいずれかである状態</u> を脂質異常症（高脂血症）という。
p245：表3-29痔瘻の右枠「受診勧奨のポイント」	（右を追加）	<u>すぐに受診が必要</u>
p253：5行目	マイン酸クロルフェニラミン	マレイン酸クロルフェニラミン
p289：下8行目と13行目	① <u>本剤をまたは鶏卵によるアレルギー症状を起こした人は使用しないこと。</u>	① <u>薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人は医師または薬剤師に相談すること。</u>
p254：(5)抗菌成分の2行目後半～4行目	……セトリミド、イソプロピルメチルフェノール、硫酸コリスチン、 <u>スルフィソミジンイソプロピルメチルフェノール</u> が用いられる。	……セトリミド、イソプロピルメチルフェノール、硫酸コリスチン、 <u>スルフィソミジン</u> が用いられる。
p268：9行目中ほど	……または、 <u>やくしゃみ</u> 、鼻みず…	……または、 <u>くしゃみ</u> 、鼻みず……
p275：9行目	・前立腺肥大による <u>排尿困難お症状</u> のある人	・前立腺肥大による <u>排尿困難の症状</u> のある人
p291： ①塗り薬の下3行目最後 ：③噴霧剤の下4行目	……刺激 <u>間振蕩</u> （文字の誤り）	……刺激感 <u>振盪</u> （震蕩、震盪でも可） *振るい動かすこと
p310：(6)サリチル酸およびイオウの使用上の注意	患部が化膿しているなど湿潤、びらんが著しい場合には、 <u>あらかじめ適切な処置を行った後使用すること。</u>	患部が化膿しているなど湿潤、びらんが著しい場合には、 <u>医師または薬剤師に相談すること。</u>
p382：重要ポイント中	（3. と7. が同内容）	（3. を削除し4. から6. までを1つ繰り上げる）
p406：重要ポイント中	2. <u>厚生労働省大臣</u>	2. <u>厚生労働大臣</u>
p416：6行目	① <u>改訂年月日</u>	① <u>改訂年月</u>