

# アンブロキソール塩酸塩

気道潤滑去痰薬

商品名（販売元）	効能・効果，用法・用量	アンブロキソール塩酸塩と他の配合成分・含有量	配合の意図
エスタックイブ ファイン*2, 3) (エスエス製薬)	風邪の諸症状の緩和； 成人（15歳以上）：1回3錠，1日3回，食後なるべく30分以内に服用 ※5日間を超えて服用しない ※15歳未満は服用しない	以下は9錠又は，3包（3.9g）中アンブロキソール塩酸塩 45mg ①イブプロフェン 450mg ②ジヒドロコデインリン酸塩 24mg	①解熱鎮痛作用 ②咳中枢に作用し，咳を鎮める
エスタックイブ ファイン顆粒*3) (エスエス製薬)	風邪の諸症状の緩和； 成人（15歳以上）：1回1包，1日3回，食後なるべく30分以内に服用 ※エスタックイブファイン参照	③d/-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ④ヨウ化イソプロパミド 6mg ⑤無水カフェイン 75mg など	③気管支拡張作用 ④抗ヒスタミン作用 ⑤鎮痛補助作用
パブロンエース AX錠*1~3) (大正製薬)	風邪の諸症状の緩和； 成人（15歳以上）：1回3錠，1日3回，食後なるべく30分以内に服用 ※エスタックイブファイン参照	以下は9錠又は，3包（3.9g）中アンブロキソール塩酸塩 45mg ①イブプロフェン 450mg ②ジヒドロコデインリン酸塩 24mg	①～⑤エスタックイブ参照
パブロンエース AX微粒*1, 3) (大正製薬)	風邪の諸症状の緩和； 成人（15歳以上）：1回1包，1日3回，食後なるべく30分以内に服用 ※エスタックイブファイン参照	③d/-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ④クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ⑤無水カフェイン 75mg など	

備考：\*1）リボフラビン（V.B<sub>2</sub>）により尿が黄色くなることあり \*2）開封後は6ヵ月以内に服用 \*3）服用時は飲酒しない

**効能・効果** 風邪の諸症状のうち，痰を出しやすくする作用がある。

受診勧奨

服用して5日経っても症状が改善しない場合

個別療法

- ・妊婦：妊婦，妊娠している可能性のある人は服用しないことが望ましい。
- ・授乳婦：授乳中には服用しないか，服用するなら授乳しない〔動物実験で母乳中への移行の報告あり〕。
- ・高齢者：一般に高齢者では生理機能が低下しているので，減量するなど注意する。
- ・小児：15歳未満は服用しない。
- ・高熱，排尿困難のある人：慎重投与，あるいは受診勧奨
- ・高血圧，心臓病，糖尿病，緑内障，肝臓病，腎臓病，甲状腺機能障害，全身性エリトマトーデス，混合性結合組織病：慎重投与，あるいは受診勧奨
- ・胃，十二指腸潰瘍，潰瘍性大腸炎，クローン病の既往のある人：慎重投与，あるいは受診勧奨

副作用

(有害事象)・初期  
症状・対処法

《重大な有害事象》

- ①ショック，アナフィラキシー様症状：全身発赤，呼吸困難，チアノーゼなど
- ②Stevens-Johnson症候群：発熱，頭痛，関節痛（初期段階では風邪に似た症状），しだいに顔面に紅斑，まぶたや眼の粘膜の充血，口腔内びらんなど

**以上，直ちに服用を中止，受診**

《その他の副作用》

- ①消化器系：胃不快感，胃痛，腹部膨満感，腹痛，下痢，嘔吐など
- ②過敏症：血管浮腫，顔面浮腫，眼瞼浮腫，口唇浮腫，発疹，蕁麻疹など
- ③肝臓：肝機能障害
- ④その他：めまい，口内しびれ感，上肢のしびれ感

**以上，服用を中止しても症状の改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談（もしくは受診）**

作用機序

肺表面活性物質の分泌促進作用により，痰と気道粘膜を潤滑化させる。気道液の分泌促進作用により，痰の粘性を下げた排出しやすくする。線毛運動亢進作用から喀痰咯出効果を現す。

〈参考1〉 医療用医薬品（ムコソルバン錠 15mg）

禁忌

アムブロキシール塩酸塩に対し過敏症の既往歴

効能・効果

①去痰作用（急性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張症など） ②慢性副鼻腔炎の排膿

用法・用量

通常，成人に対し，アムブロキシール塩酸塩として1回15mg，1日3回経口投与

重大な副作用

①ショック，アナフィラキシー様症状 ②皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）

〈参考2〉 （パブロンエースAX）

副作用情報

183例中30例（16.4%）で発現：眠気 15例，口渇 6例，便秘 4例，胃痛 3例（いずれも軽微な症状）