

薬効番号	396																			
成分名	ボグリボース																			
成分英名	Voglibose																			
販売名	ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 [会社名:東和薬品]																			
生物学的同等性資料																				
n数	11																			
投与量	1錠 (3剤3期クロスオーバー法により治験薬投与群(ボグリボース錠0.2mg「トーワ」と標準製剤)及び無投薬群に分け、治験薬投与群においては2日間毎食直前に1錠ずつ(ボグリボースとして0.2mg)反復投与した後、絶食単回投与してショ糖負荷(100g)、血漿中グルコース濃度(PBG)及び血中インスリン濃度(IRI)を測定)																			
薬物動態パラメータ	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">判定パラメータ</th> <th colspan="2">参考パラメータ</th> </tr> <tr> <th>AUC 0-2hr(mg·hr/dL)</th> <th>Cmax</th> <th>Tmax</th> <th>T1/2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被検製剤</td> <td>14.7 ± 6.4</td> <td>14.9 ± 6.4</td> <td>0.75 ± 0.45</td> <td>無投薬AUC 46.6 ± 27.4</td> </tr> <tr> <td>標準製剤</td> <td>16.0 ± 4.5</td> <td>15.3 ± 3.9</td> <td>1.07 ± 0.50</td> <td>無投薬Cmax 50.8 ± 18.4</td> </tr> </tbody> </table>		判定パラメータ		参考パラメータ		AUC 0-2hr(mg·hr/dL)	Cmax	Tmax	T1/2	被検製剤	14.7 ± 6.4	14.9 ± 6.4	0.75 ± 0.45	無投薬AUC 46.6 ± 27.4	標準製剤	16.0 ± 4.5	15.3 ± 3.9	1.07 ± 0.50	無投薬Cmax 50.8 ± 18.4
	判定パラメータ		参考パラメータ																	
	AUC 0-2hr(mg·hr/dL)	Cmax	Tmax	T1/2																
被検製剤	14.7 ± 6.4	14.9 ± 6.4	0.75 ± 0.45	無投薬AUC 46.6 ± 27.4																
標準製剤	16.0 ± 4.5	15.3 ± 3.9	1.07 ± 0.50	無投薬Cmax 50.8 ± 18.4																
薬物動態グラフ	<p style="text-align: center;">Mean ± S. D., n=11</p>																			