

薬事一郎 様のお薬の説明書です。
処方せん発行医療機関: 薬事記念病院 内科 秋葉原太郎 先生

エカベトNa顆粒66.7%「NS」



あさ 1包	ひる	ゆう 1包	ねる前
朝食後・夕食後			28日分

薬の働きと効き目
胃の粘膜を保護修復し、胃酸の働きを抑え、潰瘍や炎症を改善します。

注意すること
次のような症状に気付いたら薬の服用をやめ、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
発疹、じんま疹、かゆみ

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」

包装: ㉞ 022 本体: ㉞ 022:5



あさ 1錠	ひる	ゆう	ねる前 1錠
朝食後・寝る前			28日分
口の中ですぐに溶けますので、唾液または水で飲み込んでください。			

薬の働きと効き目
湿疹やかゆみ、鼻の炎症などのアレルギー症状を改善します。

注意すること
次のような症状に気付いたら薬の服用をやめ、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、茶褐色の尿、発熱、発疹、かゆみ、体がだるい、下痢
・眠気などがおこることがありますので、乗物または機械などの運転操作は避けてください。

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」



あさ 1~2滴	ひる 1~2滴	ゆう 1~2滴	ねる前 1~2滴
朝・昼・夕・就寝前			4本
医師の指示通り、使用してください。			

薬の働きと効き目
眼のアレルギーを抑え、充血、かゆみなどを改善します。

注意すること
次のような症状に気付いたら薬の使用をやめ、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
薬が付いたところの湿疹やかゆみ、まぶたの湿疹・かゆみ・はれ
・光を避けて保管してください。
・冷蔵庫で保管すると、結晶が析出することがありますので、避けてください。

ニフェジピンL錠20mg「アメル」 包装: KW333 本体: KW 333:20



あさ 1錠	ひる	ゆう 1錠	ねる前
朝食後・夕食後			28日分
かまずに服用してください。			

薬の働きと効き目
血管を拡げ、血圧を下げます。また、心臓の負担を軽くし、狭心症発作を防ぎます。

注意すること
次のような症状に気付いたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
発熱、全身の皮膚が赤くなる、のどの痛み、口内炎、体がだるい、手足の赤い斑点やあざ、出血(鼻・歯ぐきなど)、不安感、顔が赤く熱くなる、唇や舌・手足のしびれ感、くしゃみ、せき、のどのつまり、動悸、尿意や便意、意識が乱れ考えがまとまらない、発疹、かゆみ、下痢、皮膚や白目が黄色くなる、吐き気
・血圧の低下によるめまいなどがおこることがありますので、乗物または機械などの運転操作には注意してください。
・グレープフルーツジュースは、薬の作用を過度に強めることがありますので、注意してください。

※お薬を使用して異常を感じたら、すぐに主治医または薬剤師にご相談下さい。
※他の医療機関にかかるときやお薬を購入するときは、この文章をお見せください。薬の重複や相互作用に注意しましょう。
※お薬は光、高温、湿気を避けて保存してください。
※妊娠、授乳、妊娠予定の方、また、アレルギー体質などの方は主治医または薬剤師にご相談ください。
※お薬の写真は、本物とは大きさ・色調が異なります。
※写真のお薬の数は実際に服用する数とは異なります。