

『薬局製剤業務指針 第6版』正誤・修正情報一覧〔平成30年8月23日現在〕

第一部 薬局製剤指針編

掲載頁	一連番号・処方番号	誤	正
77	【36】鎮咳去痰薬9－①	全量 4.5 g	全量 6.0 g
366	【222】K 30	「効能又は効果」の欄： 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるもの	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるもの の次の諸症：扁桃炎，扁桃周囲炎

第二部 解説編

掲載頁	誤	正
A-83	附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 胃腸薬「局方品」の項 9	附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 胃腸薬「局方品」の項 10
A-94	9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 製剤名「B・Z・M軟膏」の列 1.0 製剤名「B・D液」の列 空欄	9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 製剤名「B・D液」の列 1.0 製剤名「B・Z・M軟膏」の列 空欄
A-119	アレルギー用剤3号 【23】抗ヒスタミン薬2－① 全量 3.0 g	アレルギー用剤3号 【23】抗ヒスタミン薬2－① 全量 4.5 g
A-125	鎮咳去痰薬5号B 【39】鎮咳去痰薬12－③ 製造方法3行目	鎮咳去痰薬5号B 【39】鎮咳去痰薬12－③ 製造方法3行目

	塩酸ブソイドエフェドリン酸 10%	塩酸ブソイドエフェドリン散 10%
A-477	少柴胡湯	小柴胡湯

第三部 使用上の注意編

掲載頁	一連番号・品目名	修正前	修正後
B-43	【16】感冒剤 9 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
B-46	【17】感冒剤 2 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
B-52	【19】感冒剤 13 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
B-65	【24】鼻炎散 1 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：ねむけを防止します。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：頭の重い感じを和らげます。
B-71	【26】鼻炎散 2 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：ねむけを防止します。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：頭の重い感じを和らげます。
B-103	【39】鎮咳去痰剤 5 号 B	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：ねむけを防止します。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：頭の重い感じを和らげます。
B-360	【166】感冒剤 14 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
B-382	【175】感冒剤 15 号 A	成分と作用	成分と作用

		成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。	成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。				
B-478	【220】甘草湯（外用）	相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください （1）～（4）（略） （5）次の症状のある人。 むくみ （6）次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病 （7）湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 （8）傷口が化膿している人。 （9）患部が広範囲の人。 2. 使用後、～（略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table><tr><th>症状の名称</th><th>症 状</th></tr><tr><td>偽アルドステロン症、 ミオパチー</td><td>手足のだるさ、しびれ、つっぱ り感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。</td></tr></table> 3. 10日間位使用しても～（略）	症状の名称	症 状	偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱ り感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。	相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください （1）～（4）（略） （5）湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 （6）傷口が化膿している人。 （7）患部が広範囲の人。 2. 使用後、～（略） 3. 10日間位使用しても～（略）
症状の名称	症 状						
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱ り感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。						
B-479	【220】甘草湯（外用）	用法・用量 （1）～（4）（略） （5）本剤が柔らかい場合には、しばらく冷やした後使用してく ださい。また、過多すぎる場合には柔らかくなった後に使用して ください。	用法・用量 （1）～（4）（略） （5）肛門部のみに使用してください。 （6）使用前によく振とうしてください。				

		(6) 肛門部のみに使用してください。 (7) 使用前によく振とうしてください。	
B-479	【220】 甘草湯（外用）	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください 2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) (5) 次の症状のある人。 むくみ (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病 (7) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (8) 傷口が化膿している人。 (9) 患部が広範囲の人。 (以下略)	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください 2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) (5) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (6) 傷口が化膿している人。 (7) 患部が広範囲の人。 (以下略)
B-535	【246】 桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、月経不順、月経困難症、打撲傷、婦人更年期障害に用いられる漢方薬です。	桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、月経不順、月経困難症、打撲症、婦人更年期障害に用いられる漢方薬です。 してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないでください

			5才未満の乳幼児。
B-536	【246】 桂枝茯苓丸	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) 1'. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください [1. の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 1'. を記載すること。] 2. 服用に際しては～ (略) 3. 直射日光の当たらない～ (略) 4. 小児の手の届かない～ (略) 5. その他 (以下略)	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください 5才未満の乳幼児。 2. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) 2'. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください [2. の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 2'. を記載すること。] 3. 服用に際しては～ (略) 4. 直射日光の当たらない～ (略) 5. 小児の手の届かない～ (略) 6. その他 (以下略)
B-541	【249】 荊防敗毒散料	荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、やせて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向がある人の、胃腸虚弱、消化不良、下痢に用いられる漢方薬です。	荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎に用いられる漢方薬です。
B-547	【252】 堅中湯	成分と分量 乾姜：1.0g	成分と分量 カンキョウ：1.0g
B-549	【253】 甲字湯	甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲傷）、しもやけ、しみ等に用いら	甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ等に用いら

		れる漢方薬です。	れる漢方薬です。				
B-596	【275】 柴芍六君子湯	柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもので、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用いられる漢方薬です。	柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもので、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用いられる漢方薬です。				
B-620	【286】 四逆散	相談すること 1. 次の人は～ （略） 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table><tr><td>症状の名称</td><td>症 状</td></tr><tr><td>偽アルドステロン症</td><td>尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。</td></tr></table> 3. 1 カ月位～ （略） 4. 長期連用する場合には、～ （略）	症状の名称	症 状	偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。	相談すること 1. 次の人は～ （略） 2. 1 カ月位～ （略） 3. 長期連用する場合には、～ （略）
症状の名称	症 状						
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。						
B-671	【308】 升麻葛根湯	相談すること 2. 服用後、～ （略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。	相談すること 2. 服用後、～ （略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table><tr><td>症状の名称</td><td>症 状</td></tr><tr><td>偽アルドステロン症、ミオパチー</td><td>手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td></tr></table>	症状の名称	症 状	偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
症状の名称	症 状						
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。						

B-758	【348】 当帰芍薬散料	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。
B-760	【349】 当帰芍薬散	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。
B-784	【360】 排膿散料	してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 次の人は服用しないでください （1） 生後 3 カ月未満の乳児。 （2） 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。	してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。
B-785	【360】 排膿散料	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください （1） 生後 3 カ月未満の乳児。 （2） 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.～6.（略）	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。 2.～6.（略）
B-786	【361】 排膿散	してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 次の人は服用しないでください （1） 生後 3 カ月未満の乳児。	してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。

		(2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。					
B-787	【361】 排膿散	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください (1) 生後 3 カ月未満の乳児。 (2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.～6. (略)	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。 2.～6. (略)				
B-841	【388】 麻子仁丸	相談すること 1. (略) 2. 服用後、～ (略) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table><tr><td>症状の名称</td><td>症 状</td></tr><tr><td>偽アルドステロン症、 ミオパチー</td><td>手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td></tr></table> 3.～5. (略)	症状の名称	症 状	偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。	相談すること 1. (略) 2. 服用後、～ (略) 3.～5. (略)
症状の名称	症 状						
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。						