

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について

平成 14 年 12 月 6 日 保医発第 1206004 号

各地方社会保険事務局長・

各都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長・

各都道府県老人医療主管部（局）老人医療主管課（部）長あて

厚生労働省保険局医療課長通知

標記については、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成 14 年厚生労働省告示第 87 号。以下「薬価基準」という。）の一部が平成 14 年 12 月 6 日付厚生労働省告示第 375 号をもって改正され、公布の日から適用されたところであるが、その概要及び留意事項は下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底をお願いする。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 平成 14 年 10 月 8 日に薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造（輸入）承認・許可され、薬価基準への収載希望があった別添の新医薬品（内用薬 6 品目、注射薬 6 品目、外用薬 2 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

- (2) 1 により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	6,299	3,401	1,942	43	11,685

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) アーチスト錠 1.25mg、同 2.5mg

本剤の用法・用量に関連する使用上の注意に「慢性心不全患者に投与する場合には、必ず 1 回 1.25mg またはさらに低用量の、1 日 2 回投与から開始し、忍容性および治療上の有効性を基に個々の患者に応じて維持量を設定すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

- (2) ストロメクトール錠 3mg

本剤の効能・効果は「腸管糞線虫症」であるので、使用にあたっては十分留意すること。

- (3) カルセド注射用 20mg、同 50mg

本剤の使用上の注意に「本剤は、緊急時に十分に措置できる医療施設及び癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される患者にのみ投与すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

- (4) ファンガード点滴用 50mg、同 75mg

本剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又はカンジダ属でないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場合は、他の薬剤に変更するなど適切な処置を行うこと。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

- (5) 乾燥 BCG 膀胱内用（コンノート株）

① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与は緊急時に十分に措置できる医療施設及び膀胱癌の治療に十分な経験を持つ医師のもと、本剤の投与が適切と判断される患者にのみ使用すること」とされているので、このような場合に限り算定できるものであること。

② また、使用上の注意に「浸潤性膀胱癌（組織学的深達度 T2 以上）は本剤の適応外であるので、投与前に浸潤性ではないことを確認してから使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。