

『薬局製剤業務指針 第6版』正誤・修正情報一覧〔令和元年6月13日現在〕

第一部 薬局製剤指針編

掲載頁	一連番号・処方番号	誤	正
77	【36】鎮咳去痰薬9－①	全量 4.5 g	全量 6.0 g
366	【222】K 30	「効能又は効果」の欄： 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるもの	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるもの次の諸症：扁桃炎，扁桃周囲炎

第二部 解説編

掲載頁	誤	正
A-83	附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 胃腸薬「局方品」の項 9	附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 胃腸薬「局方品」の項 10
A-94	9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 製剤名「B・Z・M軟膏」の列 1.0 製剤名「B・D液」の列 空欄	9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 製剤名「B・D液」の列 1.0 製剤名「B・Z・M軟膏」の列 空欄
A-119	アレルギー用剤3号 【23】抗ヒスタミン薬2－① 全量 3.0 g	アレルギー用剤3号 【23】抗ヒスタミン薬2－① 全量 4.5 g
A-125	鎮咳去痰薬5号B 【39】鎮咳去痰薬12－③ 製造方法3行目 塩酸ブソイドエフェドリン酸 10%	鎮咳去痰薬5号B 【39】鎮咳去痰薬12－③ 製造方法3行目 塩酸ブソイドエフェドリン散 10%

A-477	少柴胡湯	小柴胡湯
-------	------	------

第三部 使用上の注意編

掲載頁	一連番号・品目名	修正前	修正後
B-40	【15】感冒剤 3 号 A	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきをしずめ、 たんを切ります。	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきをしずめ ます。
B-43	【16】感冒剤 9 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
B-46	【17】感冒剤 2 号 A	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきをしずめ、 たんを切ります。	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきをしずめ ます。
		成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
B-49	【18】感冒剤 12 号 A	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきをしずめ、 たんを切ります。	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきをしずめ ます。 ※ dl -メチルエフェドリン塩酸塩散 10%は修正なし。
B-52	【19】感冒剤 13 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
		成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 %	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 %

		作用：せきをしずめ、 たんを切ります。	作用：せきをしずめ ます。
B-65	【24】 鼻炎散 1 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： ねむけを防止します。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： 頭の重い感じを和らげます。
B-71	【26】 鼻炎散 2 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： ねむけを防止します。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： 頭の重い感じを和らげます。
B-87	【33】 鎮咳去痰剤 6 号	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せき 中枢の興奮をおさえます。	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せき をしずめます。
B-103	【39】 鎮咳去痰剤 5 号 B	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： ねむけを防止します。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： 頭の重い感じを和らげます。
B-360	【166】 感冒剤 14 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
		成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきを 鎮め、たんを切ります。	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきを しずめます。
B-382	【175】 感冒剤 15 号 A	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。	成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
		成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきを 鎮め、たんを切ります。	成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 作用：せきを しずめます。

B-470	【216】 加味逍遙散料加川芎地黄（別名：加味逍遙散合四物湯）	成分と分量 1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。 <table><tr><td>成分</td><td>トウキ</td><td>ビャクジュツ</td><td>サイコ</td><td>サンベンシ</td><td>ショウキョウ</td><td>シャクヤク</td></tr><tr><td>分量</td><td>3.0g</td><td>3.0g</td><td>3.0g</td><td>2.0g</td><td>1.0g</td><td>3.0g</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>ブクリョウ</td><td>ボタンピ</td><td>カンゾウ</td><td>ハッカ</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>3.0g</td><td>2.0g</td><td>1.5g</td><td>1.0g</td><td colspan="2"></td></tr></table>	成分	トウキ	ビャクジュツ	サイコ	サンベンシ	ショウキョウ	シャクヤク	分量	3.0g	3.0g	3.0g	2.0g	1.0g	3.0g		ブクリョウ	ボタンピ	カンゾウ	ハッカ				3.0g	2.0g	1.5g	1.0g			成分と分量 1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。 <table><tr><td>成分</td><td>トウキ</td><td>ビャクジュツ</td><td>サイコ</td><td>サンベンシ</td><td>ショウキョウ</td><td>シャクヤク</td></tr><tr><td>分量</td><td>3.0g</td><td>3.0g</td><td>3.0g</td><td>2.0g</td><td>1.0g</td><td>3.0g</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>ブクリョウ</td><td>ボタンピ</td><td>カンゾウ</td><td>ハッカ</td><td>センキョウ</td><td>ジオウ</td></tr><tr><td></td><td>3.0g</td><td>2.0g</td><td>1.5g</td><td>1.0g</td><td>3.0g</td><td>3.0g</td></tr></table>	成分	トウキ	ビャクジュツ	サイコ	サンベンシ	ショウキョウ	シャクヤク	分量	3.0g	3.0g	3.0g	2.0g	1.0g	3.0g		ブクリョウ	ボタンピ	カンゾウ	ハッカ	センキョウ	ジオウ		3.0g	2.0g	1.5g	1.0g	3.0g	3.0g
成分	トウキ	ビャクジュツ	サイコ	サンベンシ	ショウキョウ	シャクヤク																																																					
分量	3.0g	3.0g	3.0g	2.0g	1.0g	3.0g																																																					
	ブクリョウ	ボタンピ	カンゾウ	ハッカ																																																							
	3.0g	2.0g	1.5g	1.0g																																																							
成分	トウキ	ビャクジュツ	サイコ	サンベンシ	ショウキョウ	シャクヤク																																																					
分量	3.0g	3.0g	3.0g	2.0g	1.0g	3.0g																																																					
	ブクリョウ	ボタンピ	カンゾウ	ハッカ	センキョウ	ジオウ																																																					
	3.0g	2.0g	1.5g	1.0g	3.0g	3.0g																																																					
B-478	【220】 甘草湯（外用）	相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) （略） (5) 次の症状のある人。 むくみ (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病 (7) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (8) 傷口が化膿している人。 (9) 患部が広範囲の人。 2. 使用後、～（略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table><tr><td>症状の名称</td><td>症 状</td></tr><tr><td>偽アルドステロン症、ミオパチー</td><td>手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td></tr></table> 3. 10日間位使用しても～（略）	症状の名称	症 状	偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。	相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) （略） (5) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (6) 傷口が化膿している人。 (7) 患部が広範囲の人。 2. 使用後、～（略） 3. 10日間位使用しても～（略）																																																				
症状の名称	症 状																																																										
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。																																																										

B-479	【220】 甘草湯（外用）	用法・用量 (1) ～ (4) （略） (5) 本剤が柔らかい場合には、しばらく冷やした後で使用してください。また、過多すぎる場合には柔らかくなった後に使用してください。 (6) 肛門部のみに使用してください。 (7) 使用前によく振とうしてください。	用法・用量 (1) ～ (4) （略） (5) 肛門部のみに使用してください。 (6) 使用前によく振とうしてください。
B-479	【220】 甘草湯（外用）	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください 2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) （略） (5) 次の症状のある人。 むくみ (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病 (7) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (8) 傷口が化膿している人。 (9) 患部が広範囲の人。 (以下略)	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください 2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) （略） (5) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (6) 傷口が化膿している人。 (7) 患部が広範囲の人。 (以下略)
B-535	【246】 桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、月経不順、月経困難症、打撲傷、婦人更年期障害に用いられる漢方薬です。	桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、月経不順、月経困難症、打撲症、婦人更年期障害に用いられる漢方薬です。

			してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないでください 5才未満の乳幼児。
B-536	【246】 桂枝茯苓丸	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) 1'. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください [1. の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 1'. を記載すること。] 2. 服用に際しては～ (略) 3. 直射日光の当たらない～ (略) 4. 小児の手の届かない～ (略) 5. その他 (以下略)	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください 5才未満の乳幼児。 2. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) 2'. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください [2. の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 2'. を記載すること。] 3. 服用に際しては～ (略) 4. 直射日光の当たらない～ (略) 5. 小児の手の届かない～ (略) 6. その他 (以下略)
B-541	【249】 荊防敗毒散料	荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、やせて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向がある人の、胃腸虚弱、消化不良、下痢に用いられる漢方薬です。	荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎に用いられる漢方薬です。
B-547	【252】 堅中湯	成分と分量 乾姜 : 1.0g	成分と分量 カンキョウ : 1.0g

B-549	【253】 甲字湯	甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲 ^傷 ）、しもやけ、しみ等に用いられる漢方薬です。	甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲 ^症 ）、しもやけ、しみ等に用いられる漢方薬です。				
B-596	【275】 柴芍六君子湯	柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもので、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、胃炎、 胃アトニー 、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用いられる漢方薬です。	柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもので、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、胃炎、 胃腸虚弱 、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用いられる漢方薬です。				
B-620	【286】 四逆散	相談すること 1. 次の人は～ （略） 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table><tr><th>症状の名称</th><th>症 状</th></tr><tr><td>偽アルドステロン症</td><td>尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。</td></tr></table> 3. 1 カ月位～ （略） 4. 長期連用する場合には、～ （略）	症状の名称	症 状	偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。	相談すること 1. 次の人は～ （略） 2. 1 カ月位～ （略） 3. 長期連用する場合には、～ （略）
症状の名称	症 状						
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。						
B-671	【308】 升麻葛根湯	相談すること 2. 服用後、～ （略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。	相談すること 2. 服用後、～ （略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。				

			症状の名称	症 状
			偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
B-758	【348】 当帰芍薬散料	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。	
B-760	【349】 当帰芍薬散	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。	当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。	
B-784	【360】 排膿散料	してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 次の人は服用しないでください （1） 生後 3 カ月未満の乳児。 （2） 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。	してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。	
B-785	【360】 排膿散料	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください （1） 生後 3 カ月未満の乳児。 （2） 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.～6.（略）	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。 2.～6.（略）	
B-786	【361】 排膿散	してはいけないこと	してはいけないこと	

		(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないでください (1) 生後 3 カ月未満の乳児。 (2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。	(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。				
B-787	【361】 排膿散	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください (1) 生後 3 カ月未満の乳児。 (2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.～6. (略)	【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 注意 1. 次の人は服用しないでください 生後 3 カ月未満の乳児。 2.～6. (略)				
B-841	【388】 麻子仁丸	相談すること 1. (略) 2. 服用後、～ (略) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table><tr><th>症状の名称</th><th>症 状</th></tr><tr><td>偽アルドステロン症、 ミオパチー</td><td>手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td></tr></table> 3.～5. (略)	症状の名称	症 状	偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。	相談すること 1. (略) 2. 服用後、～ (略) 3.～5. (略)
症状の名称	症 状						
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。						