

『薬局製剤業務指針 第6版』正誤・修正情報一覧〔令和3年6月17日現在〕

第一部 薬局製剤指針編

| 掲載頁 | 一連番号・処方番号 | 誤 | 正 |
|-----|----------------|---|--|
| 53* | 【24】抗ヒスタミン薬3-② | <p>「用法及び用量」の欄：</p> <p>1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。</p> <p>大人（15才以上）1包 1.0g，11才以上15才未満 大人の2/3，7才以上11才未満 大人の1/2，3才以上7才未満 大人の1/3</p> | <p>1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。</p> <p>大人（15才以上）1包 1.4g，11才以上15才未満 大人の2/3，7才以上11才未満 大人の1/2，3才以上7才未満 大人の1/3</p> |
| | | <p>「規格及び試験方法」の欄：</p> <p>本品は定量するとき，塩酸プソイドエフェドリン (C₁₀H₁₅NO・HCl：201.69) 5.4～6.6%，アリメマジン酒石酸塩 [(C₁₈H₂₂N₂S)₂・C₄H₆O₆：746.99] 0.15～0.18%及びカフェイン水和物 (C₈H₁₀N₄O₂・H₂O：212.21) 4.5～5.5%を含む。</p> | <p>本品は定量するとき，塩酸プソイドエフェドリン (C₁₀H₁₅NO・HCl：201.69) 3.9～4.7%，アリメマジン酒石酸塩 [(C₁₈H₂₂N₂S)₂・C₄H₆O₆：746.99] 0.11～0.13%及びカフェイン水和物 (C₈H₁₀N₄O₂・H₂O：212.21) 3.2～3.9%を含む。</p> |
| 59* | 【26】抗ヒスタミン薬5-② | <p>「用法及び用量」の欄：</p> <p>1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。</p> <p>大人（15才以上）1包 1.0g，11才以上15才未満 大人の2/3，7才以上11才未満 大人の1/2，3才以上7才未満 大人の1/3</p> | <p>1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。</p> <p>大人（15才以上）1包 1.2g，11才以上15才未満 大人の2/3，7才以上11才未満 大人の1/2，3才以上7才未満 大人の1/3</p> |
| | | <p>「規格及び試験方法」の欄：</p> <p>本品は定量するとき，<i>d</i>-クロルフェニラミンマレイン酸塩 (C₁₆H₁₉ClN₂・C₄H₄O₄：390.87) 0.18～0.22%，塩酸プソイドエフェドリン (C₁₀H₁₅NO・HCl：201.69) 5.4～6.6%，グリチルリチン酸 (C₄₂H₆₂O₁₆：822.94) 6.0～7.3%及びカフェイン水和物 (C₈H₁₀N₄O₂・H₂O：212.21) 4.5～5.5%を含む。</p> | <p>本品は定量するとき，<i>d</i>-クロルフェニラミンマレイン酸塩 (C₁₆H₁₉ClN₂・C₄H₄O₄：390.87) 0.15～0.18%，塩酸プソイドエフェドリン (C₁₀H₁₅NO・HCl：201.69) 4.5～5.5%，グリチルリチン酸 (C₄₂H₆₂O₁₆：822.94) 5.0～6.1%及びカフェイン水和物 (C₈H₁₀N₄O₂・H₂O：212.21) 3.8～4.6%を含む。</p> |

| | | | |
|-----|---------------|---|--|
| 77 | 【36】鎮咳去痰薬9-① | 全量 4.5g | 全量 6.0g |
| 82* | 【39】鎮咳去痰薬12-③ | 「用法及び用量」の欄： 1回量を次のとおりとし、1日3回、4時間以上の間隔を おいて適宜服用する。 大人（15才以上）1包 1.5g, 11才以上15才未満 大人の 2/3, 8才以上11才未満 大人の1/2, 5才以上8才未満 大人の1/3, 3才以上5才未満 大人の1/4 | 1回量を次のとおりとし、1日3回、4時間以上の間隔を おいて適宜服用する。 大人（15才以上）1包 1.6g, 11才以上15才未満 大人の 2/3, 8才以上11才未満 大人の1/2, 5才以上8才未満 大人の1/3, 3才以上5才未満 大人の1/4 |
| 366 | 【222】K30 | 「効能又は効果」の欄： 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせき がでるもの | 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせき がでるもの の次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎 |

※ 「「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」の一部訂正について」（令和3年6月16日 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 事務連絡）による正誤

第二部 解説編

| 掲載頁 | 誤 | 正 |
|-------|---|---|
| A-83 | 附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 胃腸薬「局方品」の項 9 | 附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 胃腸薬「局方品」の項 10 |
| A-94 | 9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 製剤名「B・Z・M軟膏」の列 1.0 製剤名「B・D液」の列 空欄 | 9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 製剤名「B・D液」の列 1.0 製剤名「B・Z・M軟膏」の列 空欄 |
| A-119 | アレルギー用剤3号 【23】抗ヒスタミン薬2-① 全量 3.0g | アレルギー用剤3号 【23】抗ヒスタミン薬2-① 全量 4.5g |
| A-125 | 鎮咳去痰薬5号B 【39】鎮咳去痰薬12-③ 製造方法3行目 塩酸ブソイドエフェドリン酸 10% | 鎮咳去痰薬5号B 【39】鎮咳去痰薬12-③ 製造方法3行目 塩酸ブソイドエフェドリン散 10% |

| | | |
|-------|--|--|
| A-157 | 整腸剤1号 【86】胃腸薬38-① 作用2行目 リン酸水素ナトリウムを配合した | 整腸剤1号 【86】胃腸薬38-① 作用2行目 リン酸水素カルシウムを配合した |
| A-477 | 少柴胡湯 | 小柴胡湯 |

第三部 使用上の注意編

| 掲載頁 | 一連番号・品目名 | 修正前 | 修正後 |
|------|-------------|---|---|
| B-40 | 【15】感冒剤3号A | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散1% 作用：せきをしずめ、 たんを切ります。 | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散1% 作用：せきをしずめ ます。 |
| B-43 | 【16】感冒剤9号A | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。 | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 |
| B-46 | 【17】感冒剤2号A | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散1% 作用：せきをしずめ、 たんを切ります。 | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散1% 作用：せきをしずめ ます。 |
| | | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。 | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 |
| B-49 | 【18】感冒剤12号A | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散1% 作用：せきをしずめ、 たんを切ります。 | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散1% 作用：せきをしずめ ます。 ※dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%は修正なし。 |
| B-52 | 【19】感冒剤13号A | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。 | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 |

| | | | |
|-------|------------------|---|--|
| | | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 作用：せきをしずめ、 たんを切ります。 | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 作用：せきをしずめます。 |
| B-65 | 【24】 鼻炎散 1 号 A | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： ねむけを防止します。 | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： 頭の重い感じを和らげます。 |
| B-71 | 【26】 鼻炎散 2 号 A | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： ねむけを防止します。 | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用： 頭の重い感じを和らげます。 |
| B-87 | 【33】 鎮咳去痰剤 6 号 | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 作用：せき 中枢の興奮をおさえます。 | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 作用：せきを しずめます。 |
| B-103 | 【39】 鎮咳去痰剤 5 号 B | 成分と作用 成分：安息香酸ナトリウムカフェイン 作用： ねむけを防止します。 | 成分と作用 成分：安息香酸ナトリウムカフェイン 作用： 頭の重い感じを和らげます。 |
| B-360 | 【166】 感冒剤 14 号 A | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。 | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 |
| | | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 作用：せきを 鎮め、たんを切ります。 | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 作用：せきを しずめます。 |
| B-382 | 【175】 感冒剤 15 号 A | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 また、ねむけを除きます。 | 成分と作用 成分：カフェイン水和物 作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 |
| | | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% | 成分と作用 成分：ジヒドロコデインリン酸塩散 1% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|------|---------------------|---|---|--------|-------|----|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|-----|--|--|--|------|------|------|------|--|--|---|----|-----|--------|-----|-----|--------|-------|----|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|-----|-------|-----|--|------|------|------|------|------|------|
| | | 作用：せきを鎮め、たんを切ります。 | 作用：せきをしずめます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-470 | 【216】 加味逍遙散料加 川芎地黄（別名：加味逍 遙散合四物湯） | 成分と分量 1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。 <table border="1"> <tr> <td>成分</td> <td>トウキ</td> <td>ビャクジュツ</td> <td>サイコ</td> <td>サンシ</td> <td>ショウキョウ</td> <td>シヤクヤク</td> </tr> <tr> <td>分量</td> <td>3.0g</td> <td>3.0g</td> <td>3.0g</td> <td>2.0g</td> <td>1.0g</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ブクリョウ</td> <td>ボタンピ</td> <td>カンゾウ</td> <td>ハッカ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.0g</td> <td>2.0g</td> <td>1.5g</td> <td>1.0g</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 成分 | トウキ | ビャクジュツ | サイコ | サンシ | ショウキョウ | シヤクヤク | 分量 | 3.0g | 3.0g | 3.0g | 2.0g | 1.0g | 3.0g | | ブクリョウ | ボタンピ | カンゾウ | ハッカ | | | | 3.0g | 2.0g | 1.5g | 1.0g | | | 成分と分量 1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。 <table border="1"> <tr> <td>成分</td> <td>トウキ</td> <td>ビャクジュツ</td> <td>サイコ</td> <td>サンシ</td> <td>ショウキョウ</td> <td>シヤクヤク</td> </tr> <tr> <td>分量</td> <td>3.0g</td> <td>3.0g</td> <td>3.0g</td> <td>2.0g</td> <td>1.0g</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ブクリョウ</td> <td>ボタンピ</td> <td>カンゾウ</td> <td>ハッカ</td> <td>センキョウ</td> <td>シオウ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.0g</td> <td>2.0g</td> <td>1.5g</td> <td>1.0g</td> <td>3.0g</td> <td>3.0g</td> </tr> </table> | 成分 | トウキ | ビャクジュツ | サイコ | サンシ | ショウキョウ | シヤクヤク | 分量 | 3.0g | 3.0g | 3.0g | 2.0g | 1.0g | 3.0g | | ブクリョウ | ボタンピ | カンゾウ | ハッカ | センキョウ | シオウ | | 3.0g | 2.0g | 1.5g | 1.0g | 3.0g | 3.0g |
| 成分 | トウキ | ビャクジュツ | サイコ | サンシ | ショウキョウ | シヤクヤク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分量 | 3.0g | 3.0g | 3.0g | 2.0g | 1.0g | 3.0g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブクリョウ | ボタンピ | カンゾウ | ハッカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.0g | 2.0g | 1.5g | 1.0g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成分 | トウキ | ビャクジュツ | サイコ | サンシ | ショウキョウ | シヤクヤク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分量 | 3.0g | 3.0g | 3.0g | 2.0g | 1.0g | 3.0g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブクリョウ | ボタンピ | カンゾウ | ハッカ | センキョウ | シオウ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.0g | 2.0g | 1.5g | 1.0g | 3.0g | 3.0g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-478 | 【220】 甘草湯（外用） | 相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) (5) 次の症状のある人。 むくみ (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病 (7) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (8) 傷口が化膿している人。 (9) 患部が広範囲の人。 2. 使用后、～（略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table border="1"> <tr> <td>症状の名称</td> <td>症 状</td> </tr> <tr> <td>偽アルドステロン症、 ミオパチー</td> <td>手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td> </tr> </table> | 症状の名称 | 症 状 | 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 | 相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略) (5) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 (6) 傷口が化膿している人。 (7) 患部が広範囲の人。 2. 使用后、～（略） 3. 10日間位使用しても～（略） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 症状の名称 | 症 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------|---------------|---|--|
| | | 3. 10日間位使用しても～ (略) | |
| B-479 | 【220】甘草湯 (外用) | <p>用法・用量</p> <p>(1) ～ (4) (略)</p> <p>(5) 本剤が柔らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、過多すぎる場合には柔らかくなった後に使用してください。</p> <p>(6) 肛門部のみに使用してください。</p> <p>(7) 使用前によく振とうしてください。</p> | <p>用法・用量</p> <p>(1) ～ (4) (略)</p> <p>(5) 肛門部のみに使用してください。</p> <p>(6) 使用前によく振とうしてください。</p> |
| B-479 | 【220】甘草湯 (外用) | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください</p> <p>2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください</p> <p>(1) ～ (4) (略)</p> <p>(5) 次の症状のある人。 むくみ</p> <p>(6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病</p> <p>(7) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。</p> <p>(8) 傷口が化膿している人。</p> <p>(9) 患部が広範囲の人。</p> <p>(以下略)</p> | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください</p> <p>2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください</p> <p>(1) ～ (4) (略)</p> <p>(5) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。</p> <p>(6) 傷口が化膿している人。</p> <p>(7) 患部が広範囲の人。</p> <p>(以下略)</p> |
| B-535 | 【246】桂枝茯苓丸 | <p>桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、月経不順、月経困難症、打撲傷、婦人更年期障害に用いられる漢方</p> | <p>桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、月経不順、月経困難症、打撲症、婦人更年期障害に用いられる漢方</p> |

| | | | |
|-------|--------------|--|---|
| | | 薬です。 | 薬です。 してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないでください 5才未満の乳幼児。 |
| B-536 | 【246】 桂枝茯苓丸 | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略)</p> <p>1'. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください [1. の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 1'. を記載すること。]</p> <p>2. 服用に際しては～ (略)</p> <p>3. 直射日光の当たらない～ (略)</p> <p>4. 小児の手の届かない～ (略)</p> <p>5. その他 (以下略)</p> | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 次の人は服用しないでください 5才未満の乳幼児。</p> <p>2. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) ～ (4) (略)</p> <p>2'. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください [2. の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 2'. を記載すること。]</p> <p>3. 服用に際しては～ (略)</p> <p>4. 直射日光の当たらない～ (略)</p> <p>5. 小児の手の届かない～ (略)</p> <p>6. その他 (以下略)</p> |
| B-541 | 【249】 荊防敗毒散料 | 荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、やせて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向がある人の、胃腸虚弱、消化不良、下痢に用いられる漢方薬です。 | 荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎に用いられる漢方薬です。 |

| B-547 | 【252】 堅中湯 | 成分と分量 乾姜 : 1.0g | 成分と分量 カンキョウ : 1.0g | | | | |
|-----------|---|---|--|-----|-----------|---|--|
| B-549 | 【253】 甲字湯 | 甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲傷）、しもやけ、しみ等に用いられる漢方薬です。 | 甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ等に用いられる漢方薬です。 | | | | |
| B-596 | 【275】 柴芍六君子湯 | 柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもので、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用いられる漢方薬です。 | 柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもので、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用いられる漢方薬です。 | | | | |
| B-620 | 【286】 四逆散 | 相談すること 1. 次の人は～（略） 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table border="1" data-bbox="555 986 1310 1222"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>偽アルドステロン症</td> <td>尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。</td> </tr> </tbody> </table> 3. 1カ月位～（略） 4. 長期連用する場合には、～（略） | 症状の名称 | 症 状 | 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 | 相談すること 1. 次の人は～（略） 2. 1カ月位～（略） 3. 長期連用する場合には、～（略） |
| 症状の名称 | 症 状 | | | | | | |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 | | | | | | |
| B-671 | 【308】 升麻葛根湯 | 相談すること 2. 服用後、～（略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ち | 相談すること 2. 服用後、～（略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ち | | | | |

| | | に医師の診療を受けてください。 | に医師の診療を受けてください。 | | | | |
|---------------------|---|---|--|-------|-----|---------------------|---|
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>偽アルドステロン症、 ミオパチー</td> <td>手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td> </tr> </tbody> </table> | 症状の名称 | 症 状 | 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 症状の名称 | 症 状 | | | | | | |
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 | | | | | | |
| B-758 | 【348】 当帰芍薬散料 | 当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 | 当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 | | | | |
| B-760 | 【349】 当帰芍薬散 | 当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 | 当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 | | | | |
| B-784 | 【360】 排膿散料 | <p>してはいけないこと</p> <p>（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります）</p> <p>次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 生後3カ月未満の乳児。</p> <p>(2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> | <p>してはいけないこと</p> <p>（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります）</p> <p>次の人は服用しないでください</p> <p>生後3カ月未満の乳児。</p> | | | | |
| B-785 | 【360】 排膿散料 | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 生後3カ月未満の乳児。</p> <p>(2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>生後3カ月未満の乳児。</p> <p>2.～6. (略)</p> | | | | |

| | | 2.～6. (略) | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----|---------------------|---|--|
| B-786 | 【361】 排膿散 | <p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)</p> <p>次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 生後 3 カ月未満の乳児。</p> <p>(2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> | <p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)</p> <p>次の人は服用しないでください</p> <p>生後 3 カ月未満の乳児。</p> | | | | |
| B-787 | 【361】 排膿散 | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 生後 3 カ月未満の乳児。</p> <p>(2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2.～6. (略)</p> | <p>【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】</p> <p>注意</p> <p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>生後 3 カ月未満の乳児。</p> <p>2.～6. (略)</p> | | | | |
| B-841 | 【388】 麻子仁丸 | <p>相談すること</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 服用後、～ (略)</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <table border="1" data-bbox="524 1015 1308 1246"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>偽アルドステロン症、 ミオパチー</td> <td>手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.～5. (略)</p> | 症状の名称 | 症 状 | 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 | <p>相談すること</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 服用後、～ (略)</p> <p>3.～5. (略)</p> |
| 症状の名称 | 症 状 | | | | | | |
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 | | | | | | |