

p.396 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース

(誤)

【投与経路，最大使用量，用途】

投与経路	最大使用量	用途
舌下に適用	54 mg	可溶化剤，可溶剤，結合剤，コーティング剤，賦形剤，分散剤，崩壊剤
直腸、膣、尿道に適用	160 mg	
経口投与	2.0 g	結合剤
経口投与	1.5 g	賦形剤

(正)

【投与経路，最大使用量，用途】

投与経路	最大使用量	用途
舌下に適用	54 mg	可溶化剤，可溶剤，結合剤，コーティング剤，賦形剤，分散剤，崩壊剤
直腸、膣、尿道に適用	160 mg	
経口投与	1.4 g	
経口投与	2.0 g	結合剤
経口投与	1.5 g	賦形剤

p.75～76 エデト酸カルシウムナトリウム水和物

(誤)

【各国規格比較】

	日局
成分名	エデト酸カルシウムナトリウム水和物
確認試験	①沈殿反応 ②IR ③ナトリウム塩の定性
pH	—
溶状	無色澄明 (0.25 g, 水10 mL)
重金属	20 ppm以下
ヒ素	2 ppm以下
エデト酸二ナトリウム	1.0%以下
ニトリロ三酢酸	0.1%以下
水分	5.0～13.0%
強熱残分	71.0～76.0%
定量値	98.0～102.0%
塩化物	0.10%以下
鉄	—

(正)

【各国規格比較】

	日局
成分名	エデト酸カルシウムナトリウム水和物
確認試験	①沈殿反応 ②IR ③ナトリウム塩の定性
pH	6.5～8.0
溶状	無色澄明 (0.25 g, 水10 mL)
重金属	20 ppm以下
ヒ素	—
エデト酸二ナトリウム	1.0%以下
ニトリロ三酢酸	0.1%以下
水分	5.0～13.0%
強熱残分	—
定量値	98.0～102.0%
塩化物	0.10%以下
鉄	—